

DIXENTIL

DIXENTIL è un integratore alimentare a base di Zinco con Galattooligosaccaridi e Fermenti lattici non vitali, può essere utile nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno dei suoi ingredienti.

INFORMAZIONI DEDOTTE DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

ZINCO

L'integrazione con Zinco si è dimostrata positiva nel ridurre la durata e la frequenza sia nel caso di diarrea grave che persistente (*"A meta-analysis of the effects of oral zinc in the treatment of acute and persistent diarrhea." Pediatrics. 2008*)

FERMENTI LATTICI TINDALIZZATI

I fermenti tindalizzati sono sottoposti ad una particolare tecnologia farmaceutica, la tindalizzazione, che consiste nell'esposizione ad una temperatura di 56 gradi Cj per 30 minuti, rendendoli, a differenza dei comuni fermenti lattici, inattaccabili dai succhi gastrici, dagli enzimi digestivi e dagli acidi biliari. In questo modo risultano inalterati i loro effetti benefici.

PREBIOTICI

I prebiotici sono sostanze non digeribili di origine alimentare che, quando assunte in quantità adeguate, favoriscono selettivamente la crescita e l'attività di uno o più batteri che fisiologicamente compongono la microflora intestinale. **Galatto-oligosaccaridi** sono prebiotici, fibre solubili che abbassano il pH fecale con acidificazione del contenuto intestinale, migliorano il trofismo e l'attività della mucosa intestinale e facilitano indirettamente l'assorbimento di acqua e di alcuni minerali in forma ionizzata, in particolare Calcio e Magnesio.

EVIDENZE DA STUDI CLINICI

In uno studio di fase II condotto presso l'Università di Firenze Dixentil si è dimostrato efficace nel ridurre la diarrea da radioterapia e chemioterapia (*"Nutritional supplement based on zinc, prebiotics, probiotics and vitamins to prevent radiation related gastrointestinal disorders". Anticancer research 2015*).

INDICAZIONI

Dixentil può essere utile:

- Nelle manifestazioni di diarrea grave e persistente.
- Nel mantenimento e rigenerazione della flora intestinale.
- Nelle manifestazioni contro i batteri patogeni.
- Nelle manifestazioni di diarrea infantile.
- Nella "diarrea del viaggiatore".
- Nelle diarreie indotte da radioterapia e chemioterapia.

MODALITA' D'USO

Si consiglia l'assunzione di un flaconcino al giorno, preferibilmente lontano dai pasti.

AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Non superare la dose giornaliera consigliata.

La data di scadenza si riferisce al prodotto correttamente conservato in confezione integra. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita.

